




MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

PROCESO DE VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO

Hospital General Provincial Pablo Arturo Suárez

Lcda. Rosa Chiluiza

Md. Belén Calucho



Comité de seguridad del paciente

Reporte y análisis de eventos adversos

Prácticas quirúrgicas seguras (LVCS)

Administración oportuna de antibióticos
profilácticos

Comité de control y prevención de infecciones asociadas a la atención de los servicios de salud

Guía de antibioticoterapia empírica,
por tipo de infección.

Administración oportuna de antibióticos
profilácticos



VIGILANCIA

 Ministerio de Salud Pública
CATÁLOGO DE INDICADORES
Proceso de Asesoría y Apoyo
Proceso de Gobernanza y Vigilancia de la Salud
Proceso de Provisión y Calidad de los Servicios
Consolidado - Ministerio de Salud Pública
Jerarquía de Indicadores



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR

SISTEMA INTEGRADO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
SUBSISTEMA DE
VIGILANCIA SIVE – HOSPITAL**

MÓDULO I
INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD


Enero de 2014

Indicador	Frecuencia	Unidad responsable
Porcentaje incidencia de Infecciones del Sitio Quirúrgico (ISQ)	Mensual	Gestión de Calidad

4) Componente de vigilancia en internación quirúrgica.

- Colecistectomía laparoscópica.
- Colecistectomía por laparotomía.
- Apendicectomía.
- Herniorrafia inguinal.
- Prótesis de cadera.
- Prótesis de rodilla.
- Trasplante hepático.
- Trasplante renal.

Porcentaje incidencia de infecciones del sitio quirúrgico HPAS, enero – agosto 2019



Criterio 1: Infección profunda

1. La infección se produce dentro del período establecido en la siguiente tabla después de la intervención quirúrgica (donde el día 1 = al día del procedimiento).

Dentro de los 30 días	Dentro de los 90 días
Colecistectomía laparoscópica Colecistectomía por laparotomía Apendicectomía Trasplante renal Trasplante hepático Cesárea	Prótesis de cadera Prótesis de rodilla Herniorrafia inguinal

**A. Infección
Incisional
Superficial**



**B. Infección
Incisional
Profunda**



**C. Infección de
Órganos y
Espacios**



FACTORES DE RIEGO

Exógena




Endógena



○ Riesgo de Infección:

✓ Herida limpia	< 2%
✓ Herida limpia contaminada	< 10%
✓ Herida contaminada	20%
✓ Herida sucia / Infectada	40%



FLUJOGRAMA PARA LA NOTIFICACIÓN DE INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO

