

GUÍA BÁSICA PARA AISLAMIENTO - HGDC

*No necesita aislamiento

ESTÁNDAR*

HIV
BLEE
AmpC
Herpes en un solo dermatomo
E.coli sensible

CONTACTO

KPC, MBL
Hisopado rectal positivo
Bacterias R a Meropenem o Imipenem
S. aureus R a oxacilina (MRSA)
Enterococcus R a vancomicina (VRE)
Hepatitis A (con diarrea)
Hepatitis B o C (diarrea con sangre)
Herpes Zóster en dos dermatomas
Meningitis Bacteriana (<24h con antibiótico)
COVID-19
Escabiosis
Varicela



GOTAS

Meningitis bacteriana (<24h con antibiótico)
COVID-19
Influenza
Parvovirus



AEROSOL

Tuberculosis pulmonar (sospecha o confirmación)
Sarampión
COVID-19
Varicela
Viruela
Herpes zóster en dos dermatomas o más



INMUNO SUPRIMIDO

Contacto + aerosol

<500 neutrófilos
Quemaduras extensas
Neoplasias hematológicas
Herpes zóster + inmunosupresión



- El manejo de fluidos y secreciones independientemente del aislamiento, requiere el uso de guantes de manejo.
- Recordar el uso de mascarilla en el contexto de la pandemia por COVID-19.