

**INSTRUCTIVO DE TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS DE HISOPADO RECTAL
PARA SCREENING KPC**

1. PROCEDIMIENTO/ PROTOCOLOS EN LOS QUE APLICA

Procedimiento de prevención y control de pacientes colonizados por Enterobacteriales productoras de carbapenemasas, ver link:

https://drive.google.com/drive/folders/1xuV5Q1XXIkPHjtaAGfnFk_Sp1XMJrlpG?usp=sharing

Procedimiento de Ingreso de pacientes a UCI

Procedimiento de egreso de pacientes de UCI

NOTA: El hisopado rectal se indica en la pre-alta para los pacientes de UCI que van a hospitalizaciones.

2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD DESCRITA

Describir los pasos a seguir para la toma correctamente las muestras de hisopado rectal para screening de bacterias productoras de carbapenemasas y manejo de transporte a laboratorio.



3. INSUMOS NECESARIOS

- Hisopos con medio de transporte Stuart-Amies.
- Guantes de manejo
- Recipiente para transporte

4. TAREAS A REALIZAR

N°	TAREA	REGISTRO DOCUMENTAL
ANTES DEL PROCEDIMIENTO		
1	Realizar la solicitud como indica el procedimiento de laboratorio y colocar el nombre de la prueba "Hisopado rectal"	N/A
2	Rotular el medio de transporte con los datos del paciente (Nombres, apellidos y número de cédula) y especificar el tipo de cultivo (Hisopado Rectal).	Formulario SNS-MSP/HCU-form. 010A/2008 -SOLICITUD DE LABORATORIO
3	Colocar los materiales en el entorno del paciente en la mesa de curaciones.	
4	Realizar Higiene de Manos "Aplicar Procedimiento" ver link: https://drive.google.com/file/d/1V0AwtD1En0oJhwAYulUzjmoP8psbT3jb/view?usp=sharing	N/A
DURANTE EL PROCEDIMIENTO		
5	Informar al paciente sobre el procedimiento a realizar.	N/A
6	Colocar al paciente en posición de cubito lateral e indicar como se realizara el procedimiento.	

**INSTRUCTIVO DE TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS DE HISOPADO RECTAL
PARA SCREENING KPC**

7	Realizar Higiene de Manos “Aplicar Procedimiento” ver link: https://drive.google.com/file/d/1V0AwtD1En0oJhwAYuIUzimoP8psbT3jb/view?usp=sharing	N/A
8	Proceder a colocarse los guantes de manejo previo higiene de manos.	
9	Introducir el hisopo suavemente a través del esfínter anal 2.5 cm desde la base del algodón. 	N/A
10	Rotar varias veces el hisopado contra las paredes rectales. El hisopo debe venir con presencia de heces para ser una muestra significativa.	N/A
11	Dejar aproximadamente 20 segundos para que absorban los microorganismos.	N/A
12	Extraer el hisopo y colocarlo en el medio de transporte, lo suficientemente profundo para que el medio de transporte (Stuart) cubra la base de algodón. 	N/A
DESPÚES DEL PROCEDIMIENTO		
13	Dar comodidad y confort al paciente.	N/A
14	Proceder a retirarse los guantes y colocarlos en el tacho de desechos infecciosos, posterior se realiza la higiene de manos.	

**INSTRUCTIVO DE TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS DE HISOPADO RECTAL
PARA SCREENING KPC**

15	Transportar la muestra a temperatura ambiente hasta el laboratorio en menos de 15 minutos de acuerdo a las recomendaciones que se describen en el procedimiento de manejo y transporte de muestras al laboratorio clínico.	N/A
16	NOTA: Los hisopados rectales para screening de bacterias productoras de carbapenemasas, se aceptarán durante 24 horas en el laboratorio incluidos fines de semana para su procesamiento el día lunes.	

	NOMBRES	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Dra. Evelyn Sánchez	Especialista en Infectología	
	Lcda. Marisol Basantes	Responsable de la Gestión de Calidad	
	Dra. Estefanía Rivadeneira	Vigilancia Epidemiológica	
Revisado por:	Dr. Giovanni Núñez	Coordinador Técnico de Laboratorio	
Validado por:	Dr. Danny Flores	Director Asistencial	
Aprobado por:	Dra. Malena Ortiz	Gerente General	

5. ANEXOS

N/A